

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України**

Олена КРАМАРЕНКО

2022 р.



ТАРНА ЕТИКЕТКА

Альпака (Alpaca), КС

азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л,
фунгіцид

1. Заявник: ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia (Словенія). E-mail: infoTKI@albaugh.eu. Тел.: +386 (0)2 60 90 211, факс: +386 (0)2 60 90 410

2. Виробники: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232

Рейнбоу Агросаєнсиз (Панама) С.А. (Rainbow Agrosociences (Panamá) S.A.). Адреса: PCC Spec 9097, Local # 5, Panamá Pacífico, Rep. De Panamá. Supplier phone: 507-66138266.

ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia (Словенія). E-mail: infoTKI@albaugh.eu. Тел.: +386 (0)2 60 90 211, факс: +386 (0)2 60 90 410.

3. Призначення: комбінований фунгіцид системної дії.

4. Класифікація по ВООЗ, токсичність: 2 клас небезпечності (високостійкий у воді).

5. Реєстраційний номер: 15172 серія А № 09701.

6. Пакування: пластикові, ПЕТ, скляні або металеві ємності від 100 мл до 1000 л.

7. Дата виготовлення: на упаковці.

8. Гарантійний термін зберігання: 3 роки.

9. Сумісність з іншими препаратами: можливе створення бакових сумішей. Перед приготуванням бакових сумішей провести пробне змішування. Препарат проявляє фітотоксичний ефект при змішуванні з продуктами у формі концентрату, що емульгується (КЕ). Крім того, ад'юванти, які містять певну форму силікону, можуть сприяти фітотоксичності.

10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: перед застосуванням тару з препаратом ретельно розтрусити. Необхідну кількість препарату залити постійно розмішуючи в заповнений на 1/3 бак обприскувача. Через декілька хвилин долити водою до повного об'єму бака.

Робочий розчин використати в день його приготування. Витрата робочої

рідини – 300 л/га.

11. Рекомендації щодо застосування: в сільському господарстві відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів наведених в таблиці

Норма витрати препарату	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Макс. кратність обробки
0,5-0,75 л/га	Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржа	Обприскування у період вегетації	2
0,5-0,75 л/га	Озимий та ярий ячмінь	Борошниста роса, іржа, плямистості	Обприскування посівів у фазу куціння та прапорцевого листка	2
0,75-1,0 л/га	Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла і сіра гниль, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	2
0,5-0,75 л/га	Соя	Пероноспороз, борошниста роса, фузаріозне в'янення, іржа	Обприскування в період вегетації	2
0,75-1,0 л/га	Соняшник	Фомоз, альтернарія, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	1-2

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

12. Вимоги щодо зберігання, перевезення: При транспортуванні, використанні та зберіганні необхідно дотримуватись вимог, що викладені у Державних санітарних правилах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98. Препарат необхідно зберігати на спеціалізованих складах, що відповідають санітарним вимогам, у закритій заводській упаковці.

13. Перша медична допомога: Осіб, у яких з'явилися перші ознаки

нездужання, необхідно відсторонити від роботи, вивести з зони забруднення і надати першу допомогу.

Потерпілого необхідно звільнити від одягу, що стискує. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи - обережно зняти з потерпілого забруднений спецодяг і респіратор.

При попаданні препарату на шкіру слід змити її струменем води чи зняти ватою або шматком тканини (не втираючи), а потім промити водою або слабким содовим розчином.

При попаданні в очі необхідно негайно ретельно і рясно промити їх водою або 2% розчином питної соди.

При надходженні препарату у шлунок не викликати блювоту.

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно доставити в лікарню.

Специфічний антидот відсутній, лікування симптоматичне.

14. Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: при роботі з препаратом та тарі з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98.

У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту, видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари.

Забороняється повторне використання тари.

Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті), і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

15. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо застосування.

Горизонтальна лінія зеленого кольору